



**Le Sonneur à ventre jaune est un petit amphibien atteignant 4,5 cm au stade adulte. Son dos est aplati et couvert de petites verrues. Son ventre est jaune vif ou tirant sur l'orangé, parsemé de taches irrégulières grises. Il se reconnaît également aux pupilles de son œil, en forme de cœur.**



### Cycle biologique

Les pontes (2 à 3 par an), ont lieu de mai à juillet. Les œufs sont fixés sur la végétation aquatique. L'éclosion a lieu après 8 à 12 jours d'incubation. La métamorphose a lieu en juillet. Adulte à 3 ans, le Sonneur peut vivre jusqu'à 20 ans en s'éloignant peu de son lieu de naissance.



### Habitats privilégiés

L'espèce est plutôt forestière. Son habitat est le plus fréquemment constitué par des flaques d'eau stagnante, des ornières, des fossés, des gravières, des petites mares.



### Répartition géographique

Cette espèce est présente sur une bonne partie de l'Europe centrale et méridionale, à l'exception de la péninsule ibérique. En France, l'espèce est encore bien présente même si sa répartition est morcelée. Au niveau du site de la ZSC, les populations de Sonneurs sont assez importantes dans le massif forestier.



### Menaces

Les principales menaces sont :

- le comblement des zones humides et des fossés,
- le curage des fossés en période d'activité de l'espèce,
- les pollutions de l'eau (pesticides, carburants),
- les passages de véhicules et d'engins dans les chemins présentant des ornières.

### Préconisations de gestion

- Proscrire le comblement des ornières forestières entre le 15 mars et le 15 août
- Ne pas stocker de grumes dans les fossés