



**Le Milan noir est un rapace carnassier de 55 à 60 cm qui se nourrit majoritairement de proies déjà mortes. Bien qu'il semble noir à contre-jour, il est en réalité d'un brun assez uniforme. La poitrine et la tête sont plus ou moins teintées de gris. Le bec est noir et les pattes sont jaunes.**



### Cycle biologique

Fin avril, la femelle pond 2 à 3 œufs dont l'incubation dure 32 jours. Elle ne quitte pas le nid tandis que le mâle est chargé du ravitaillement. Les jeunes s'envolent au bout de 6 semaines.



### Habitats privilégiés

Le Milan noir affectionne les vallées et les plaines. Le site choisi pour la reproduction doit présenter de grands arbres et se situer à proximité de cours d'eau, ou de points d'eau qui sont nécessaires à son approvisionnement et à son alimentation. Le Milan noir peut également s'établir en bordure des villes.



### Répartition géographique

Son aire de répartition est particulièrement vaste. Il occupe pratiquement toutes les régions tropicales et tempérées de l'Ancien Monde. Il est migrateur, passe l'été en Europe et l'hiver en Afrique. En France, il n'est absent qu'au nord-ouest et au niveau du littoral méditerranéen. En Alsace, on le rencontre principalement le long du Rhin et des principales rivières. Sur la ZPS, les habitats qui lui sont favorables se situent au niveau des lisières nord et est du massif forestier ainsi qu'aux abords des sablières en eau, mais ces habitats sont très localisés.



### Menaces

Les principales menaces qui pèsent sur l'espèce sont :

- la dégradation de la qualité de l'eau (diminution des proies),
- les dérangements lors de la période de reproduction,
- les collisions avec les véhicules et les électrocutions (lignes électriques).

### Préconisations de gestion

- Améliorer la qualité des cours d'eau
- Maintenir des grands arbres au niveau des berges des cours d'eau
- Mettre en place des actions de sensibilisation du public (respect de la quiétude)